

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με ένα ταξίδι εξαρτώνται από παράγοντες όπως ο προορισμός, η εποχή, οι συνθήκες και η διάρκεια της διαμονής, ο σκοπός της επίσκεψης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη (ηλικία, φύλο, κατάσταση υγείας, συμπεριφορά). Επομένως, η αντιμετώπιση του ταξιδιώτη χρειάζεται να εξατομικεύεται και να γίνεται κατόπιν αξιολόγησης του κινδύνου και κλινικής εκτίμησης από τον επαγγελματία υγείας.

Θα ήταν σκόπιμο τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες πριν από το ταξίδι να προγραμματίζεται η επίσκεψη σε επαγγελματία υγείας ή σε ένα από τα ιατρεία ταξιδιωτικής ιατρικής ή στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας. Αυτή η επίσκεψη είναι απαραίτητη, έστω και την τελευταία στιγμή.

Η επιλογή των εμβολίων εξαρτάται από την επιδημιολογία των νοσημάτων σε κάθε προορισμό, τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού (π.χ. συνθήκες, σκοπός, διάρκεια), τις δραστηριότητες του ταξιδιώτη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως η ηλικία, το ιστορικό υγείας και εμβολιασμού και η συμπεριφορά του.

Τα μόνα εμβόλια που απαιτούνται για να επιτραπεί η είσοδος σε ορισμένες χώρες είναι το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού και το εμβόλιο του μηνιγγιτιδοκόκκου.

Το ταξίδι αποτελεί μία καλή ευκαιρία να γίνουν αναμνηστικές δόσεις των εμβολίων «ρουτίνας» όπως του τετάνου/διφθερίτιδας, της πολιομυελίτιδας και της ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR), τα οποία πολλοί παραλείπουν να κάνουν στην ενήλικη ζωή τους και συστήνεται να γίνονται πριν από ένα ταξίδι στο εξωτερικό.

Κάθε ταξιδιώτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο προληπτικός εμβολιασμός δεν προσφέρει πλήρη προστασία. Χρειάζεται να λαμβάνει τα γενικά προληπτικά μέτρα π.χ. για τα δήγματα από έντομα και ζώα, για τα νοσήματα που μεταδίδονται από τρόφιμα και νερό, για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α.

Βιβλιογραφία

1. International Travel and Health. World Health Organization (WHO). Στο: <http://www.who.int/ith/> (προσπέλαση 10/12/2013)
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Travelers' Health. Στο: <http://www.cdc.gov/travel/> (προσπέλαση 10/12/2013)

*Παρατηρήσεις σχετικά με τα συνιστώμενα εμβόλια στον Πίνακα

Συνιστάται όλοι οι ταξιδιώτες πριν το ταξίδι να έχουν τον εμβολιασμό τους επικαιροποιημένο σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της Ελλάδας.

1. Εμβόλιο τετάνου – διφθερίτιδας. Συστήνεται αναμνηστική δόση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.

2. Εμβόλιο πολιομυελίτιδας. Συνιστάται οι ταξιδιώτες προς περιοχές υψηλού κινδύνου για κυκλοφορία του ιού της πολιομυελίτιδας (όπως ενδημικές περιοχές, επιδημία πολιομυελίτιδας ή περιβαλλοντικές ενδείξεις κυκλοφορίας του ιού) να είναι πλήρως εμβολιασμένοι για την ηλικία τους, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Οι ενήλικες που είχαν εμβολιασθεί με 3 ή περισσότερες δόσεις στην παιδική ηλικία συστήνεται να κάνουν μία αναμνηστική δόση εφ' άπαξ για όλη την ενήλικη ζωή. Επίσης, αναμνηστική δόση συνιστάται στους ενήλικες που ταξιδεύουν προς περιοχές που συνορεύουν με περιοχές υψηλού κινδύνου για κυκλοφορία του ιού της πολιομυελίτιδας.

3. Εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR). Συστήνεται σε όσους δεν έχουν χορηγηθεί 2 δόσεις ή δεν έχουν νοσήσει από τη νόσο.

4. Εμβόλιο ηπατίτιδας Α. Συστήνεται σε ταξιδιώτες χωρίς ανοσία που ταξιδεύουν σε χώρες μέσης ή υψηλής ενδημικότητας για ηπατίτιδα Α. Οι ταξιδιώτες μπορούν να προσβληθούν από ηπατίτιδα Α ακόμη και όταν παραμένουν σε πολυτελή ξενοδοχεία.

5. Εμβόλιο τυφοειδούς πυρετού. Συστήνεται σε όσους πρόκειται να εκτεθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μολυσμένο νερό ή φαγητό και ιδιαίτερα αν ταξιδέψουν σε μικρότερες πόλεις, χωριά ή αγροτικές περιοχές με χαμηλού επιπέδου υγειονομικές συνθήκες.

6. Εμβόλιο ηπατίτιδας Β. Συστήνεται αν ο κίνδυνος έκθεσης σε αιματογενώς ή σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι υψηλός ή αν η παραμονή στην περιοχή είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών.

7. Εμβόλιο λύσσας. Συστήνεται αν πρόκειται να εκτεθεί κανείς σε άγρια ή κατοικίδια ζώα για λόγους επαγγελματικούς ή αναψυχής.

8. Εμβόλιο ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Συστήνεται αν πρόκειται να επισκεφτεί κανείς αγροτικές περιοχές για χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων εβδομάδων ή εάν στον τόπο προορισμού υπάρχει γνωστή επιδημία ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας (το εμβόλιο της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας δεν κυκλοφορεί προς το παρόν στην Ελλάδα).

9. Εμβόλιο μηνιγγίτιδας. Συνιστάται το τετραδύναμο εμβόλιο σε όλους τους ταξιδιώτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σε ενδημικές περιοχές όπως οι χώρες της Αφρικής που βρίσκονται εντός της «ζώνης της μηνιγγίτιδας». Η Σαουδική Αραβία απαιτεί πιστοποιητικό εμβολιασμού για να επιτρέψει την είσοδο στους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια του προσκυνημάτος στη Μέκκα. Η αναγκαιότητα εμβολιασμού αυξάνει κατά την περίοδο της ξηρασίας και στην περίπτωση που οι ταξιδιώτες πρόκειται να συναναστραφούν στενά με κατοίκους της περιοχής ή να παραμείνουν πάνω από 1 μήνα ή αν κάνουν συχνά ταξίδια σ' αυτές τις περιοχές.

10. Το εμβόλιο γρίπης, συστήνεται σε ταξιδιώτες που εκτιμώνται ως υψηλού κινδύνου και κυρίως κατά τη διάρκεια της εποχικής γρίπης (χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο, καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο).

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Αγία Ελένη, Ηνωμένο Βασίλειο (Saint Helena)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Αζόρες, Πορτογαλία (Azores)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Αίγυπτος (Egypt)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή. Όλοι οι ταξιδιώτες που έρχονται από το Σουδάν χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή επίσημο πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία του Σουδάν διαβεβαιώνοντας ότι ο ταξιδιώτης δεν επισκέφθηκε περιοχές στο Σουδάν νοτιότερα από τον 15ο παράλληλο εντός του τελευταίου εξαημέρου.
Αιθιοπία (Ethiopia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών. Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η διαμονή τους περιορίζεται στην περιοχή Αφάρ (Afar) και στις Σομαλικές Επαρχίες (Somali Provinces).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Αϊτή (Haiti)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'Ivoire/ Ivory Coast)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Αλβανία (Albania)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Αλγερία (Algeria)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Αμερικανική Σαμόα (American Samoa/US)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Ανατολικό Τιμόρ (Timor-Leste/East Timor)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Αγκίλα (Anguilla) (Ηνωμένο Βασίλειο)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ανγκόλα (Angola)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους
Ανδόρα (Andorra)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Ανταρκτική (Antarctica)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Αντιγκουα και Μπαρμπουντα Νησιά (Antigua & Barbuda)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Αργεντινή (Argentina)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	<p>Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που θα επισκεφθούν δασώδεις περιοχές βόρεια και βορειοανατολικά, που συνορεύουν με την Παραγουάη και τη Βραζιλία και είναι σε υψόμετρο < 2300 μ. Συνιστάται εμβολιασμός στις περιοχές: Κορριέντες (Corrientes): Μπερόν ντε Ασταντα (beron de Astrada), Καπιταλ (Capital), Γκενεραλ Αλβεαρ (General Alvear), Γκενεραλ Παζ (General Paz), Ιτατι (Itati), Ιτουτζαινγκο (Ituzaingo), Πάσο ντε λος Λίμπρες (Paso de los Libres), Σαν Κοσμε (San Cosme), Σαν Μαρτιν (San Martín), Σαν Μιγκελ (San Miguel) και Σαντο Τομε (Santo Tomé). Σε όλες τις περιοχές της επαρχίας Μισιονες (Misiones) και στους καταράκτες Ιγκουασού (Iguazu). Δεν συνιστάται εμβολιασμός στις περιοχές σε υψόμετρο < 2300 μ: Επαρχία Τσακο (Chaco): Μπερμέχο (Bermejo). Όλες οι περιοχές της Φορμόσα (Formosa). Επαρχία Χουχουι (Jujuy): Λεδεσμα (Ledesma), Σαν Πέντρο (San Pedro), Σαντα Μπαρμπαρα (Santa Bárbara), Βαλε Γκραντε (Vale Grande). Επαρχία Σαλτα (Salta): Αντα (Anta), Γκενεραλ Χοσε ντε Σαν Μαρτιν (General José de San Martín), Οραν (Oran), Ριβανταβια (Rivadavia). Δε συνιστάται εμβολιασμός σε υψόμετρο > 2300μ και στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.</p>	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Αρμενία (Armenia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), πολιομυελίτιδας, MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Αρούμπα (Aruba)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 6 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Αυστραλία (Australia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που φθάνουν στην Αυστραλία μετά από εξαήμερη ή μεγαλύτερη παραμονή τους σε χώρα υψηλού κινδύνου για μετάδοση κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένων των Σαο Τομε (Sao Tome) και Πριντσιπε (Principe), Σομαλία και Τανζανία, εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ και στην Αργεντινή περιορίζεται στην επαρχία Μισιονες (Misiones Province).
Αυστρία (Austria)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Αφγανιστάν (Afghanistan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Βανουάτου Νησιά (Vanuatu)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Βέλγιο (Belgium)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Βενεζουέλα (Venezuela)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών. Συνήθως δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται στις περιοχές: Αραγκουα (Aragua), Καραμπομπο (Carabobo), Μιραντα (Miranda), Βαργκας (Vargas), Γαρακουί (Yaracuy) Ντιστριτο Φεντεραλ (Distrito Federal). Δεν συνιστάται στις περιοχές Φαλκόν (Falcon), Λάρα (Lara), στη χερσόνησο του Παεζ (Paez) στην επαρχία Zulia, στο νησί Μαργαρίτα (Margarita) και στις πόλεις Κάρakas και Βαλένθια.	Όχι
Βερμούδες (Bermuda, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Βιετνάμ (Vietnam)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Βιρμανία/ Μπούρμα (Burma/ Myanmar)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή. Επίσης απαιτείται από τους πολίτες της Βιρμανίας που αναχωρούν προς ενδημικές περιοχές.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Βολιβία (Bolivia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών που ταξιδεύουν ανατολικά της οροσειράς των Άνδεων σε υψόμετρο <2300μ: στις επαρχίες Μπενι (Beni), Παντο (Pando), Σαντα Κρουζ (Santa Cruz), και ορισμένες περιοχές των Τσουκουισακα (Chuquisaca), Κοτσαμπαμπα (Cochabamba), Λα Παζ (La Paz) και Ταριχια (Tarija). Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται σε υψόμετρο >2300μ και σε όλες τις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω και στις πόλεις Λα Παζ (La Paz) και Σουκρε (Sucre).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Βόρεια Κορέα (North Korea)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Βόρεια Μαριανά Νησιά και Σαϊπαν, Τίνιαν, Ρότα (Northern Mariana, Saipan, Tinian, Rota) (ΗΠΑ)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Bosnia-Herzegovina)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Βουλγαρία (Bulgaria)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Βραζιλία (Brazil)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	<p>Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται τις περιοχές: Ακρε (Acre), Αμαπά (Amapá), Αμαζόνες (Amazones), Ντιστριτο Φεντεράλ (Distrito Federal) και η πρωτεύουσα Μπραζιλία (Brasília), Γκοϊάς (Goiás), Μαράναο (Maranhão), Ματο Γκροσσο (Mato Grosso), Ματο Γκροσσο ντε Σολ (Mato Grosso do Sul), Μίνας Γκεράις (Minas Gerais), Παρα (Pará), Ροντονία (Rondônia), Ροράιμα (Roraima), Τοκαντίνς (Tocantins), και ορισμένες περιοχές των πολιτειών: Μπαία (Bahia), Παρανά (Paraná), Πιαουί (Piauí), Ρίο Γκραντε ντε Σολ (Rio Grande do Sul), Σαντα Καταρίνα (Santa Catarina) και Σαο Παουλο (São Paulo). Συνιστάται στους καταρράκτες Ιγκουασσού (Iguassu).</p> <p>Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που το ταξίδι τους περιορίζεται σε περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω και στις πόλεις Φορταλετσα (Fortaleza), Ρεσιφε (Recife), Ρίο ντε Τζανειρο (Rio de Janeiro), Σαλβαδόρ (Salvador) και Σαο Παουλο (São Paulo).</p>	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Βρετανικά Νησιά Ινδικού Ωκεανού και Ντιέγκο Γκαρσία (British Indian Ocean Territory, Diego Garcia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Γαλλία (France)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Γαλλική Γουιάνα (French Guiana)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους
Γαλλική Πολυνησία (French Polynesia), και τα νησιά: Σοσιετυ-Ταϊτή, Μορεα, Μπορα Μπορα, Μαρκεσσας- Ιβα Οα, Ουα Ουκα, Αουστραλ-Τουμπουαι, Ρουρουτου (Society-Tahiti, Moorea,	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Bora-Bora, Marquesas- Hiva Oa, Ua Huka, Austral- Tubuai, Rurutu			
Γερμανία (Germany)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Γεωργία (Georgia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Γιβραλτάρ (Gibraltar/ UK)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Γκάμπια (Gambia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Γκαμπόν (Gabon)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους
Γκάνα (Ghana)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9μηνών

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Γκουαμ, ΗΠΑ (Guam, USA)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Γουαδελούπη (Guadeloupe) και St. Barthelemy, Saint Martin (Γαλλία)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Γουατεμάλα (Guatemala)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Γουέικ Νησί (Wake Island, US)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Γουιάνα (Guyana)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή, με εξαίρεση τις Αργεντινή, Παραγουάη, Σουρινάμ, Τρινιντάντ και Τομπάγκο.
Γουϊνέα (Guinea)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Γουϊνέα-Μπισό (Guinea-Bissau)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Γρενάδα (Grenada)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Γροιλανδία, Δανία (Greenland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Δανία (Denmark)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής (Central African Republic)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών
Δημοκρατία του Κονγκό- Κινσάσα (Democratic Republic of Congo- Kinshasa)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών, εκτός από εκείνους που θα επισκεφθούν μόνο την Επαρχία Κατάνγκα (Katanga Province)	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Δομινικανική Δημοκρατία (Dominican Republic)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Δομνίκα (Dominica)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Δυτική Σαχάρα (Western Sahara)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Δεν έχει δηλώσει τις απαιτήσεις της για το πιστοποιητικό εμβολιασμού κίτρινου πυρετού
Εκουαδór/ νησιά Γκαλαπάγκος (Ecuador, Galápagos Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	<p>Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών προς την ανατολική περιοχή της οροσειράς των Άνδεων σε υψόμετρο <2300μ: Μορονα-Σαντιαγκο (Morona-Santiago), Ναπο (Napo), Ορελλανα (Orellana), Πασατσα (Pastaza), Σουκουμπιος (Sucumbios) και Ζαμορα-Τσιντσιπε (Zamora-Chinchipe).</p> <p>Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται στην δυτική περιοχή των Άνδεων σε υψόμετρο <2300μ: Εσμεραλδας (Esmeraldas), Γκουαγιας (Guayas), Λος Ριος (Los Rios), Μαναμπι (Manabi), και σε περιοχές των: Ατσουαι (Azua), Μπολιβάρ (Bolivar), Κανάρ (Canar), Καρτσι (Carchi), Τσιμπορατζο (Chimborazo), Κοτοπαξι (Cotopaxi), Ελ Ορο (El Oro), Ιμπουμπαρα (Imbabura), Λοχα (Loja), Πιτσιντσα (Pichincha) και Τουνγκουραχουα (Tungurahua).</p> <p>Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που επισκέπτονται μόνο περιοχές σε υψόμετρο >2300μ, τις πόλεις Γκουαγιακουιλ (Guayaquil) και Κιτο (Quito) ή τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos).</p>	Απαιτείται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή. Οι πολίτες και οι κάτοικοι του Εκουαδór απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον κίτρινο πυρετό όταν αναχωρούν προς ενδημικές περιοχές.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ελβετία (Switzerland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Ελλάδα (Greece)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Ελ-Σαλβαδόρ (El Salvador)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες 1-60 ετών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ερυθραία (Eritrea)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνήθως δεν συνιστάται στις περιοχές: Ανσεμπα (Anseba), Ντεμπουμπ (Debub), Γκας Μπαρκα (Gash Barka), Μαε Κελ (Mae Kel), Σεμεναουί Κεϊ Μπαρι (Semenawi Keih Bahri). Δεν συνιστάται στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω και στο αρχιπέλαγος Νταλακ (Dahlack).	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Εσθονία (Estonia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Ζάμπια (Zambia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνήθως δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις βορειοδυτικές και δυτικές επαρχίες (North West, Western Provinces). Δεν συνιστάται στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ζιμπάμπουε (Zimbabwe)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (United Arab Emirates)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (USA)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Ηνωμένο Βασίλειο και νησιά Τσανελ και Μαν (United Kingdom, Channel Islands, Isle of Man)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Ιαπωνία (Japan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ινδία (India)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	<p>Οι ταξιδιώτες (με εξαίρεση τα βρέφη <9 μηνών) που φθάνουν με αεροπλάνο ή πλοίο χωρίς πιστοποιητικό απομονώνονται έως 6 μέρες αν :</p> <p>1) αναχώρησαν από ενδημική περιοχή τις προηγούμενες 6 μέρες,</p> <p>2) βρέθηκαν σε ενδημική περιοχή για μετεπιβίβαση (transit)(εξαιρούνται οι ταξιδιώτες και τα μέλη του πληρώματος που κατά τη μετεπιβίβασή τους παρέμειναν στους χώρους του αεροδρομίου και ο υγειονομικός υπεύθυνος συμφωνεί να εξαιρεθούν),</p> <p>3) φθάνουν με πλοίο που ξεκίνησε ή έκανε στάση σε λιμάνι ενδημικής περιοχής, έως 30 μέρες πριν την άφιξη στην Ινδία, εκτός αν το πλοίο ακολούθησε της οδηγίες απεντόμωσης του ΠΟΥ,</p> <p>4) φθάνουν με αεροσκάφος που ξεκίνησε από ενδημική περιοχή και δεν απεντομώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες των Indian Aircraft Public Health Rules (1954) ή ΠΟΥ.</p>

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
			<p>Περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Αφρική: Ανγκόλα (Angola), Μπενίν (Bénin), Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso), Μπουρουντί (Burundi), Καμερούν (Cameroon), Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής (Central African Republic), Τσάντ (Chad), Κόνγκο (Congo), Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'Ivoire), Δημοκρατία του Κονγκό (Democratic Republic of the Congo), Ισημερινή Γουινέα (Equatorial Guinea), Αιθιοπία (Ethiopia), Γκαμπόν (Gabon), Γκάμπια (Gambia), Γκάνα (Ghana), Γουινέα (Guinea), Γουινέα Μπισσό (Guinea-Bissau), Κένυα (Kenya), Λιβερία (Liberia), Μάλι (Mali), Νίγηρας (Niger), Νιγηρία (Nigeria), Ρουάντα (Rwanda), Σενεγάλη (Senegal), Σιερρα Λεόνε (Sierra Leone), Σουδάν (Sudan), Τόγκο (Togo), Ουγκάντα (Uganda). Αμερική: Βολιβία (Bolivia), Βραζιλία (Brazil), Κολομβία (Colombia), Εκουαδόρ (Ecuador), Γαλλική Γουιάνα (French Guiana), Γουιάνα (Guyana), Παναμά (Panama), Περού (Peru), Σουρινάμ (Suriname), Τρινιντάντ και Τομπαγκο (Trinidad/Tobago) και Βενεζουέλα (Venezuela).</p> <p>Σημείωση: Όταν αναφερθεί ένα κρούσμα κίτρινου πυρετού σε μια χώρα, η Ινδική Κυβέρνηση την θεωρεί χώρα με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού και προστίθεται στη λίστα.</p>
Ινδονησία (Indonesia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ιορδανία (Jordan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ιράκ (Iraq)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ιράν (Iran)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ιρλανδία (Ireland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ισημερινή Γουϊνέα (Equatorial Guinea)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ισλανδία (Iceland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Ισπανία (Spain)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ισραήλ (Israel)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Ιταλία, Βατικανό (Italy, Holy See)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Καζακστάν (Kazakhstan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Καμερούν (Cameroon)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους
Καμπότζη (Cambodia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Καναδάς (Canada)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Κανάρια Νησιά, Ισπανία (Canary Islands, Spain)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Κατάρ (Qatar)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Καϋμαν Νήσια, Ηνωμένο Βασίλειο (Cayman, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Κένυα (Kenya)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών. Συνήθως δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που θα επισκεφθούν μόνο: την Βόρεια Ανατολική Επαρχία (North Eastern Province), στην Επαρχία Κοασταλ (Coastal) τις περιοχές Κιλιφι (Kilifi), Κουαλε (Kwale), Λαμου (Lamu), Μαλιντι (Malindi) και Ταναριβερ (Tanariver) και τις πόλεις Μομπάσα (Mombasa) και Ναϊρόμπι (Nairobi).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Κίνα (China)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας (Χινζιανγκ), ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ηλικίας ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Κιργιστάν (Kyrgyzstan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Κιριμπατι-πρώην νησιά Γκιλπερτ, Ταραουα, Ταμπουαρεαν-νησιά Φανινγκ, Μπαναμπα, Οσεαν (Kiribati-Gilbert Islands, Tarawa, Tabuaeran-Fanning Island, Banaba-Ocean Island)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Κοκος-Κιλιγκ Νησιά, Αυστραλία (Cocos-Keeling Islands, Australia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους που φθάνουν στην Αυστραλία μετά από εξαήμερη παραμονή τους ή έστω και μια διανυκτέρευση, σε χώρα υψηλού κινδύνου για μετάδοση κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένων των Σάο Τόμ και Πρίντσιπε (Sao Tome, Principe), Σομαλία (Somalia), Τανζανία (Tanzania), Επαρχία Μισιονες (Misiones Province) στην Αργεντινή (Argentina) και εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ (Ecuador).

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Κολομβία (Colombia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών προς περιοχές με υψόμετρο <2300μ: Αμαζονας (Amazonas), Αντιοκουία (Antioquia), Αραουκα (Arauca), Ατλαντικό (Atlántico), Μπολιβάρ (Bolívar), Μπογιακά (Boyacá), Καλντας (Caldas), Κακετα (Caquetá), Κασαναρε (Casanare), Καουκα (Cauca), Κεσαρ (Cesar), Τσοκο (Choco) [μόνο οι περιοχές Ακαντι (Acandí), Χουραντο (Juradó), Ριοσουτσιο (Riosucio), Ουνγκκουία (Unguía)], Κοντομπα (Córdoba), Κουντιναμαρκα (Cundinamarca), Γκουαινία (Guainía), Γκουαβιαρε (Guaviare), Χουίλα (Huila), Λα Γκουαχίρα (La Guajira) [μόνο οι περιοχές Αλμπανία (Albania), Μπαρρανκας (Barrancas), Ντιμπουλα (Dibulla), Ντιστρατσιόν (Distracción), Ελ Μολίνο (El Molino), Φονσεκα (Fonseca), Χατονουεβο (Hatunuevo), Λα Τζαγκουα ντελ Πίλαρ (La Jagua del Pilar), Μαικαιο (Maicao), Μανασουρε (Manaure), Ριοχάκα (Riohacha), Σαν Χουαν ντελ Τσεσαρ (San Juan del Cesar), Ουρουμίτα (Urumita), Βιλανουεβα (Villanueva)], Μαγδαλενα (Magdalena), Μετα (Meta), Νορτε ντε Σανταντερ (Norte de Santander), Πουτουμαγιο (Putumayo), Κιντιο (Quindío), Ρισαλανδα (Risaralda), Σαν Ανδρες (San Andrés) και Προβιντεντσια (Providencia), Σανταντερ (Santander), Σουκρε (Sucre), Τολίμα (Tolima), Βαουπες (Vaupés) και Βιχάδα (Vichada).	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
		Συνήθως δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η διαμονή τους περιορίζεται στις δυτικές περιοχές στις Άνδεις σε υψόμετρο <2300μ: Καουκα (Cauca), Ναρινο (Nariño), Βαλλε ντε Καουκα (Valle de Cauca) και κεντρικό και νότιο Τσοκο (Choco) και τις πόλεις Μπαρραγκίλα (Barranquilla), Καλι (Cali), Καρταγκενα (Cartagena) και Μεντελίν (Medellín). Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που ταξιδεύουν σε περιοχές με υψόμετρο >2300μ, στη Μποκοτά (Bogotá) και στην Ουριμπια (Uribia) στη Λα Γκουαχίρα (La Guajira).	
Κομορος Νησιά (Comoros)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Κονγκό-Μπραζαβιλ (Republic of the Congo-Brazzaville)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους
Κόσοβο (Kosovo)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Α, ηπατίτιδας Β	Όχι	Δεν έχει δηλώσει τις απαιτήσεις για το πιστοποιητικό εμβολιασμού κίτρινου πυρετού
Κόστα Ρίκα (Costa Rica)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή (εξαιρούνται οι Αργεντινή, Παναμάς, Τρινταντ και Τομπάγκο) και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Κούβα (Cuba)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Κουβέιτ (Kuwait)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Κουκ Νησιά, Νέα Ζηλανδία (Cook Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Κριστμας Νησιά, Αυστραλία (Christmas Island, Australia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που φθάνουν στην Αυστραλία μετά από εξαήμερη παραμονή τους ή έστω και μια διανυκτέρευση, σε χώρα υψηλού κινδύνου για μετάδοση κίτρινου πυρετού, συμπεριλαμβανομένων των Σάο Τόμπε και Πρίντσιπε (Sao Tome, Principe), Σομαλία (Somalia), Τανζανία (Tanzania), Επαρχία Μισιονες (Misiones Province) στην Αργεντινή (Argentina) και εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ (Ecuador).
Κροατία (Croatia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Κύπρος (Cyprus)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Λάος (Laos)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Λεσότο (Lesotho)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Λετονία (Latvia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Λευκορωσία (Belarus)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Λίβανος (Lebanon)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 6 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Λιβερία (Liberia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Λιβύη (Libya)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Λιθουανία (Lithuania)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Λιχτενστάιν (Liechtenstein)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Λουξεμβούργο (Luxembourg)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Μαγιότ, Γαλλία (Mayotte)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μαδαγασκάρη (Madagascar)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μαδέιρα Νησιά, Πορτογαλία (Madeira Islands, Portugal)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μακάο-Κίνα (Macau SAR-China)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Μαλαισία (Malaysia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Μαλάουι (Malawi)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Μαλδίβες (Maldives)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μάλι (Mali)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται στους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών προς περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που η παραμονή τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μάλτα (Malta)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή. Τα παιδιά <9 μηνών που φθάνουν από ενδημικές περιοχές ενδέχεται να χρειαστούν απομόνωση ή επιτήρηση, αν ενδείκνυται από τα επιδημιολογικά κριτήρια. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού.
Μαρόκο (Morocco)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Μαρσαλ Νησιά (Marshall Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Μαρτινίκα, Γαλλία (Martinique)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσα	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μαυρίκιος (Mauritius)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μαυριτανία (Mauritania)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε ταξιδιώτες ≥9 μηνών προς περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται σε εκείνους που η παραμονή τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μαυροβούνιο (Montenegro)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Μεξικό (Mexico)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Μικρονησία και τα νησιά Γιαπ, Πονπεϊ, Τσουουκ, Κοσραε (Federated States of Micronesia, Yap Islands, Pohnpei, Chuuk, Kosrae)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Μογγολία (Mongolia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μοζαμβίκη (Mozambique)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μολδαβία (Moldova)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Μονακό (Monaco)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Μονσερά, Ηνωμένο Βασίλειο (Montserrat, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μπαγκλαντές (Bangladesh)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μπαρμπειντος Νησιά (Barbados)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή, με εξαίρεση τις Γουιάνα (Guyana), Τριτάντ, Τομπάγκο (Trinidad, Tobago) και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μπαχάμες (Bahamas)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Μπαχρέιν (Bahrain)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μπελιζ (Belize)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Μπενίν (Benin)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Μποτσουάνα (Botswana)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Μπουρουντί (Burundi)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Μπουτάν (Bhutan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Μπρούνεϊ (Brunei)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ναμίμπια (Namibia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες που έρχονται από ενδημικές περιοχές. Οι χώρες ή τμήματα χωρών που εντοπίζονται στην ενδημική ζώνη της Αφρικής ή της Νότιας Αμερικής θεωρούνται υψηλού κινδύνου για μετάδοση κίτρινου πυρετού. Οι επιβάτες προγραμματισμένων πτήσεων, που αναχώρησαν από μη ενδημική χώρα, αλλά είχαν μετεπιβίβαση (transit) σε ενδημική χώρα, δεν χρειάζεται να προσκομήσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με την προϋπόθεση ότι παρέμειναν στο αεροδρόμιο ή σε γειτονική πόλη κατά τη μετεπιβίβαση. Όλοι οι επιβάτες, που ταξίδεψαν με μη προγραμματισμένη πτήση ή αναχώρησαν από ενδημική περιοχή, χρειάζεται να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό από τα παιδιά < 1 έτους, αλλά συνιστάται να βρίσκονται υπό επιτήρηση.
Ναούρου Νησιά (Nauru)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Νέα Ζηλανδία (New Zealand)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Νέα Καληδονία-Γαλλία (New Caledonia-France)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή. Υπό την απειλή επιδημίας μπορεί να απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Νεπάλ (Nepal)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Νησί του Πάσχα-Χιλή (Easter Island)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Νίγηρας (Niger)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε ταξιδιώτες ≥9 μηνών προς περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται σε εκείνους που η παραμονή τους περιορίζεται στην έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους. Η κυβέρνηση του Νίγηρα συνιστά εμβολιασμό στους ταξιδιώτες που αναχωρούν από τον Νίγηρα.
Νιγηρία (Nigeria)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Νικαράγουα (Nicaragua)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Νιουι- Νέα Ζηλανδία (Niue)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Νορβηγία (Norway)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Νόρφολκ Νησιά-Αυστραλία (Norfolk Island)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥1 έτους που φθάνουν στην Αυστραλία έξι μέρες μετά από μια διανυκτέρευση ή μεγαλύτερη παραμονή τους σε ενδημική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Σαο Τομε (Sao Tome) και Πριντσιπε (Principe), Σομαλία και Τανζανία, εξαιρούνται τα νησιά Γκαλαπάγκος (Galapagos) στο Εκουαδόρ και στην Αργεντινή περιορίζεται στην επαρχία Μισιονες (Misiones Province).
Νότια Αφρική (South Africa)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και στις περιοχές Ερυθραία (Eritrea), Σαο Τομε και Πριντσιπε (Sao Tomé, Principe), Σομαλία (Somalia), Τανζανία (Tanzania) και Ζάμπια (Zambia) ή μετεπιβίβαση στο αεροδρόμιο ενδημικής περιοχής
Νότια Γεωργία και Νότια Σάντουιτς Νησιά (South Georgia & South Sandwich Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Δεν έχουν καταθέσει στοιχεία για τα πιστοποιητικά που χρειάζονται
Νότια Κορέα (South Korea)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Νότιο Σουδάν	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), πολιομυελίτιδας, MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β, λύσσας, μηνιγγίτιδα	Συνιστάται σε ταξιδιώτες ≥9 μηνών	Δεν έχουν καταθέσει στοιχεία για τα πιστοποιητικά που χρειάζονται
Ολλανδία (Netherlands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Ολλανδικές Αντίλλες (Antilles): Μπонаίρ, Κουρακαο, Σάμπα, Αγ. Ευστάθιος, Άγ. Μαρτίνος (Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustasius, St. Maarten)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και >6 μηνών
Ομάν (Oman)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ονδούρα (Honduras)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ουγγαρία (Hungary)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Ουγκάντα (Uganda)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ουζμπεκιστάν (Uzbekistan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Ουκρανία (Ukraine)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Ουρουγουάη (Uruguay)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Πακιστάν (Pakistan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Παλαου Νησιά (Palau)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Παναμάς (Panama)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών προς όλες τις ηπειρωτικές περιοχές ανατολικά της ζώνης Διώρυγας (Canal Zone), περιλαμβάνει το σύνολο των comarcas (αυτόνομα εδάφη) των Εμπερα (Emberá) και Κουνα Γιαλα (Kuna Yala), όλη την επικράτεια του Νταριέν (Darién) και τις ανατολικές περιοχές της ζώνης Διώρυγας (Canal Zone) Κολον (Colón) και Παναμά (Panamá). Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που περιορίζονται στη ζώνη Διώρυγας (Canal Zone) και στις περιοχές δυτικά αυτής, στην πόλη του Παναμά και στα νησιά Σαν Μπλας (San Blas) και Μπαλμποα (Balboa).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Παπούα Νέα Γουινέα (Papua New Guinea)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Παραγουάη (Paraguay)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥9 μηνών. Συνήθως δεν συνιστάται σε εκείνους που επισκέπτονται μόνο την πόλη Ασουντσιον (Asunción).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Παρθένοι Νήσοι, ΗΠΑ (Virgin Islands, US)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Παρθένοι Νήσοι, Μεγάλη Βρετανία (Virgin Islands, British)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Περου	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές με υψόμετρο $< 2300\mu$: όλες οι περιοχές των Αμαζονας (Amazonas), Λορετο (Loreto), Μαδρε ντε Ντιος (Madre de Dios), Σαν Μαρτιν (San Martin), Ουκαγιαλι (Ucayali) και συγκεκριμένες περιοχές των: άπω βορειοανατολικό Ανκας (Ancash), βόρειο Απουριμακ (Apurimac), βόρειο και βορειοανατολικό Αγιακουτσο (Ayacucho), βόρειο και ανατολικό Καχαμαρκα (Cajamarca), βορειοδυτικό, βόρειο και βορειοανατολικό Κουσκο (Cusco), άπω βόρειο Χουανκαβελικα (Huancavelica), βόρειο, κεντρικό και ανατολικό Χουανουκο (Huanuco), βόρειο και ανατολικό Χουνιν (Junin), ανατολικό Λα Λιμπερταντ (La Libertad), κεντρικό και ανατολικό Πασκο (Pasco), ανατολικό Πιουρα (Piura) και βόρειο Πουνο (Puno). Συνήθως δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που περιορίζονται στις δυτικές περιοχές στις Άνδεις (Andes): όλες οι περιοχές Λαμπαγκεκε (Lambayeque, Tumbes) και ορισμένες περιοχές της κεντρικής και δυτικής Καγαμαρκα (Cajamarca) και δυτικό Πιουρα (Piura). Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που περιορίζονται σε περιοχές με υψόμετρο $> 2300\mu$, περιοχές δυτικά της οροσειράς Άνδεις (Andes) που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα, στις πόλεις Κουσκο (Cuzco) και Λίμα (Lima), στο Ματσου Πίτσου (Machu Picchu) και στο μονοπάτι των Ίνκας (Inca).	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Πιτκερν Νησιά, Ηνωμένο Βασίλειο (Pitcairn Islands, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Πολωνία (Poland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Πορτογαλία (Portugal)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Πουέρτο Ρίκο (Puerto Rico)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Πράσινο Ακρωτήριο (Cape Verde)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ρεουνιόν, Γαλλία (Réunion)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Ρουάντα (Rwanda)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ρουμανία (Romania)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Ρωσία (Russia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Σαιντ Λουσία (Saint Lucia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Σαμόα (Samoa) -πρώην Δυτική Σαμόα (Western Samoa)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Σαν Μαρίνο (San Marino)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε Νησιά (Sao Tomé & Príncipe)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνήθως δεν συνιστάται	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Σαουδική Αραβία (Saudi Arabia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Σεν Βίνσεντ και Γρεναδίνες (Saint Vincent & Grenadines)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Σεν Κιτς και Νεβις, Ηνωμένο Βασίλειο (Saint Kitts & Nevis)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Σεν Πιερ και Μικελόν, Γαλλία (Saint Pierre & Miquelon)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Σενεγάλη (Senegal)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Σερβία (Serbia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Σεϋχέλλες (Seychelles)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Σιγκαπούρη (Singapore)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους που εντός των προηγούμενων 6 ημερών επισκέφθηκαν ενδημική περιοχή ή έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Σιέρα Λεόνε (Sierra Leone)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες
Σλοβακία (Slovakia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Σλοβενία (Slovenia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Σολωμόντα Νησιά (Solomon Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Σομαλία (Somalia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), πολιομυελίτιδας, MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνήθως δε συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις περιοχές: Μπακολ (Bakool), Μπαναντιρ (Banaadir), Μπαι (Bay), Γκαλγκουντουντ (Galguduud), Γκεντο (Gedo), Χιρααν (Hiiraan), Χουμπαμπαντα (Lower/Middle Jubabada), Σαμπελε (Lower/ Middle Shabelle). Δεν συνιστάται στις περιοχές που δεν αναφέρονται παραπάνω.	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Σουαζιλάνδη (Swaziland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Σουδάν (Sudan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται σε ταξιδιώτες που περιορίζονται στην έρημο Σαχάρα και στην πόλη Χαρτούμ (Khartoum).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή. Μπορεί να απαιτείται πιστοποιητικό από ταξιδιώτες που αναχωρούν από το Σουδάν
Σουηδία (Sweden)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Σουρινάμ (Surinam)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Σρι Λάνκα (Sri Lanka)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Συρία (Syria)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 6 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Ταϊβάν (Taiwan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Όχι
Τανζανία, Ζανζιβάρη (Tanzania, Zanzibar)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνήθως δεν συνιστάται	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Τατζικιστάν (Tajikistan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Ταϊλάνδη (Thailand)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Τερκς και Κάικος Νησιά (Turks & Caicos Islands, UK)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Τζαμάϊκα (Jamaica)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Τζιμπουτί (Djibuti)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Τόγκο (Togo)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους
Τοκελαου, Νέα Ζηλανδία (Tokelau)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Τόνγκα (Tonga)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τουβαλου (Tuvalu)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τουρκία (Turkey)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τουρκμενιστάν (Turkmenistan)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τρινιντάντ και Τομπάγκο (Trinidad & Tobago)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται το Τρινιντάντ (Trinidad). Συνήθως δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται αστικές περιοχές στο Port of Spain, στους επιβάτες σε κρουαζιερόπλοια που δεν θα αποβιβαστούν και στους επιβάτες αεροπλάνου με ενδιάμεσο σταθμό (transit) την περιοχή. Δεν συνιστάται σε εκείνους που περιορίζονται στο Τομπάγκο (Tobago).	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Τσαντ (Chad)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), πολιομυελίτιδας, MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, μηνιγγίτιδας	Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες ≥ 9 μηνών που επισκέπτονται περιοχές νότια από την έρημο Σαχάρα. Δεν συνιστάται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται μόνο την έρημο Σαχάρα.	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Τσεχία (Czech Republic)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Όχι
Τυνησία (Tunisia)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Υεμένη (Yemen)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), πολιομυελίτιδας, MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή
Φαροε Νησιά, Δανία (Faroe Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας B, λύσσας	Όχι	Όχι
Φιλιππίνες (Philippines)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας A, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας B, ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού

Χώρα	Εμβόλια		
	Συνιστώμενα εμβόλια*	Κίτρινου πυρετού	
		Συνιστάται	Απαιτείται
Φινλανδία (Finland)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Β, λύσσας	Όχι	Όχι
Φιτζι Νησιά (Fiji)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Απαιτείται από όλους τους ταξιδιώτες ≥ 1 έτους αν προηγείται ταξίδι σε ενδημική περιοχή και από εκείνους που έκαναν μετεπιβίβαση (transit) >12 ώρες στο αεροδρόμιο χώρας με κίνδυνο μετάδοσης κίτρινου πυρετού
Φωκλαντ Νησιά (Falkland Islands)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Χιλή (Chile)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
Χόνγκ Κονγκ-Κίνα (Hong Kong SAR, China)	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, τυφοειδούς πυρετού, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι
FYROM	τετάνου-διφθερίτιδας (Td), MMR, ηπατίτιδας Α, λύσσας, ηπατίτιδας Β	Όχι	Όχι